

AUTOPSIA PSICOLOGICA



AUTOPSIA PSICOLOGICA

Un proceso indirecto de recolección y análisis de información respecto al comportamiento de una persona que ha fallecido, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su muerte.

* Actualmente complementa la

AUTOPSIA PSICOLOGICA

El origen de la Autopsia Psicológica se remonta a los años 50 en la ciudad de Los Ángeles (EU), específicamente “es el Doctor Shneidman quien a partir de los años 60, junto con Farberow, describen en detalle el procedimiento,

AUTOPSIA PSICOLOGICA

DEFINICION

La Autopsia Psicológica es entendida como “un proceso de recolección de datos que permite reconstruir el perfil psicológico de una persona y su estado mental antes del deceso por causa dudosa (suicidio, homicidio, muerte accidental o natural)”

AUTOPSIA PSICOLOGICA

En si, la AUTOPSIA PSICOLÓGICA es la exploración psicobiográfica de las conductas y de la vida anímica de la persona, encaminada a esclarecer las causas de su muerte. Se realiza a través de una serie de investigaciones retrospectivas, indirectas y posmortem

AUTOPSIA PSICOLOGICA

PRINCIPIO BASICO DE LA AUTOPSIA PSICOLOGICA

La víctima deja “evidencia psicológica” en la escena de la muerte, en los espacios que habitó y en sus obras.

AUTOPSIA PSICOLOGICA

Por medio de esta técnica se buscan las huellas psicológicas que el psiquismo y la conducta de una persona han dejado en vida, pudiendo describir y comprender el perfil probable de personalidad de un fallecido, detectar factores de riesgo suicida o descartarlos, evaluar el estado mental al momento de la muerte, establecer áreas de conflicto y de crisis, establecer el modelo vincular,

AUTOPSIA PSICOLOGICA

HISTORIA

1947: La Habana Jack Lester Mee

1961: Los Angeles Robert Lipman crea una guía

1980: Asociación Médica Americana se interesa por alta tasa de suicidios

1983: México Psiquiatras validan un método con estudio de 10 casos

1995: Colombia tesis e incursiones

1997: Uso en Chile y Honduras

1999: Cuba aparece el MAPI

AUTOPSIA PSICOLOGICA

USO DE ESTADÍSTICAS DE SUICIDIO Y DE AUTOPSIAS PSICOLÓGICAS

Clínico: características de los
suicidas

Estadístico: tendencias espacio -
temporales

Epidemiológico: Identificar
factores de riesgo

AUTOPSIA PSICOLOGICA

En la Autopsia Psicológica, se hace necesario revisar el posible vínculo entre el probable victimario y la supuesta víctima, pues de ello depende el lograr un eficiente y adecuado diagnóstico del hecho que se investiga, así como del perfil que se logra obtener de la persona fallecida.

AUTOPSIA PSICOLOGICA

PARA COMPRENDER AL VICTIMARIO

Evitar pensar como uno mismo,
con sus propios gustos,
necesidades, deseos y moralidad
Aceptar que cualquier sentimiento
o comportamiento puede ser
disfrutado o erotizado

AUTOPSIA PSICOLOGICA

PARA COMPRENDER A LA VÍCTIMA

Por qué quería morir?
Quién quería hacerle daño?
Cómo murió?
Qué estilo de vida la mató?

AUTOPSIA PSICOLOGICA

La Autopsia Psicológica se emplea más comunmente en los casos de suicidio, el cual se define como “el comportamiento intencional autodestructivo, llevado a cabo por una persona en una etapa de su vida altamente vulnerable” (Marchiori 1992)

AUTOPSIA PSICOLOGICA

El comportamiento suicida puede tener éxito o no, lo que señala la mayor o menor probabilidad de morir, así entonces se habla de:

Suicidio

Vs. Intento de suicidio

Vs. Parasuicidio

- ◆ Planeación
- ◆ Letalidad del arma
- ◆ Probabilidad de ser salvado

AUTOPSIA PSICOLOGICA

FACTORES DE RIESGO PARA EL SUICIDIO

- ◆ Menores de 25 y mayores de 65
- ◆ Sin relación de pareja
- ◆ Sin vínculo laboral
- ◆ Hombres
- ◆ Aislamiento
- ◆ Uso de tóxicos
- ◆ 25% intento pre-suicida
- ◆ Aviso presuicida

AUTOPSIA PSICOLOGICA

PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA EL SUICIDIO

- ◆ Deseo de escapar del dolor físico o mental.
- ◆ Fantasía de vivir en la eternidad con el ser amado.
- ◆ Enojo, rabia, venganza.
- ◆ Vergüenza o expiación de la culpa
- ◆ Deseo de ser rescatado
- ◆ Deseo de hacer una declaración o comunicación importante.

AUTOPSIA PSICOLOGICA

INDICADORES DE PROBABLE CONDUCTA SUICIDA

- (1) Pérdida o aumento significativo de apetito y de peso.
- (2) Cambio en los hábitos de sueño, sueño excesivo o incapacidad para dormir.
- (3) Agitación conductual o un retardo en el movimiento.
- (4) Pérdida de interés o placer en las actividades usuales o en el

AUTOPSIA PSICOLOGICA

INDICADORES DE PROBABLE CONDUCTA SUICIDA

- (5) Pérdida de energía o fatiga.
- (6) Habilidad disminuida para pensar o concentrarse.
- (7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva
- (8) Aislamiento de familia y amigos.
- (9) Cambios drásticos de humor.

AUTOPSIA PSICOLOGICA

INDICADORES DE PROBABLE CONDUCTA SUICIDA

- (10) Cambio súbito en la conducta
- (11) Hablar sobre el suicidio.
- (22) Regalar posesiones o hacer un testamento.
- (13) Obsesión con la muerte, música o poesía triste. Los temas de muerte en cartas o trabajo de arte.
- (14) Planeación para cometer suicidio y acceso a medios letales.

AUTOPSIA PSICOLOGICA

ESTADO DE MEXICO 2005 SUICIDIOS OCURRIDOS EN EL AÑO 2005

	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SUICIDIOS	84	8	5	6	5	5	12	9	10	8	7	1	0
HOMBRES	58	6	3	5	3	4	8	6	8	5	5	0	0
MUJERES	26	2	2	1	2	1	4	3	2	3	2	1	0

AUTOPSIA PSICOLOGICA

SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Algunos datos de suicidios acaecidos en el Estado de México en el 2005

Suicidios ocurridos TOTAL 84

Causa del suicidio

Causa amorosa 5

Dificultad económica 5

Disgusto familiar 10

Enfermedad grave o incurable 1

Otras causas 23

No especificada 40

AUTOPSIA PSICOLOGICA

SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Sitio de ocurrencia del suicidio

Casa habitación 71

Vía pública 1

Campo 4

Otros lugares 6

No especificado 2

AUTOPSIA PSICOLOGICA

SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Medio empleado por el suicida

Arma de fuego 11
Estrangulación 57
Veneno tomado 10
Otros medios 6
No especificado 0

Sexo del suicida

Hombres 58
Mujeres 26

AUTOPSIA PSICOLOGICA

SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Grupo de edad del suicida

Menores de 15 años 11
De 15 a 24 años 26
De 25 a 34 años 20
De 35 a 44 años 8
De 45 años y más 12
No especificado 7

Estado conyugal (civil) del suicida

Soltero 45
Casado 20
Unión libre 13
Otro estado conyugal (civil) 3
No especificado 3

AUTOPSIA PSICOLOGICA

SUICIDIO EN EL ESTADO DE MEXICO

Nivel de escolaridad del suicida 65

Primaria 29

Secundaria 25

Preparatoria 8

Profesional 3

Otro nivel de escolaridad 0

Ocupación del suicida 27

Trabajadores agropecuarios 3

Artesanos y obreros 6

Oficinistas 5

Comerciantes y dependientes 2

Otras ocupaciones 11

AUTOPSIA PSICOLOGICA

La Autopsia Psicológica persigue cuatro objetivos principales:

1.- Determinar el modo de muerte (homicidio, suicidio, accidente, muerte natural) No la causa, ni la manera.

2.- Prevenir suicidios

AUTOPSIA PSICOLOGICA

3. Establecer el periodo psicológico y comportamental del tiempo de muerte
4. Ofrecer apoyo terapéutico para los familiares y amigos del occiso

AUTOPSIA PSICOLOGICA

La aplicación del PAP se deberá realizar de acuerdo con la legislación de cada país, que se encarga de decidir cuándo y por qué se debe llevar a cabo este procedimiento, así como el tiempo necesario para realizarlo.

En nuestro país, no se cuenta con la legislación respectiva para tal efecto. Sin embargo, se aplica en

AUTOPSIA PSICOLOGICA

El PAP consta de cuatro ejes principales:

- 1.- Datos personales del occiso y detalles de la muerte
- 2.- Historia del occiso a través de documentos

AUTOPSIA PSICOLOGICA



- 3.- Construcción retrospectiva de la personalidad y conducta social
 - 4.- Anotaciones y conclusiones
- 

AUTOPSIA PSICOLOGICA

Para el óptimo desarrollo de este procedimiento es importante que los profesionales de los campos de la psicología, medicina, psiquiatría y derecho se unan para identificar las causas y consecuencias de las muertes dudosas.

AUTOPSIA PSICOLOGICA

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA AUTOPSIA PSICOLOGICA

- 1.- Entrevistar a los que conocían al occiso
- 2.- Revisión del expediente policial y medicina legal
- 3.- Consultar a investigadores policiales
- 4.- Revisar el lugar de habitación y objetos personales del occiso
- 5.- Evaluar el estilo de vida, los

AUTOPSIA PSICOLOGICA

- 6.- Analizar notas y apuntes de la victima.
- 7.- Realizar entrevistas a los amigos, compañeros de trabajo y familiares.
- 8.- Investigar los eventos precedentes a la muerte,
- 9.- Revisar la historia psicológica de la victima y su historia de vida,
- 10.- Entrevistar a alguien que

AUTOPSIA PSICOLOGICA

SUGERENCIAS PARA UNA AUTOPSIA PSICOLOGICA PRECISA

- ◆ Pasar mucho tiempo en el ambiente personal y con los objetos de la víctima.
- ◆ Desplazarse como acostumbraba la víctima.
- ◆ Recrear las últimas 24 horas en la vida del occiso.

AUTOPSIA PSICOLOGICA

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

Schneidman (1969) Planteó un instrumento que constaba de 14 indicadores.

Ebert (1987) Su instrumento contenía 22 indicadores.

García T. (1999) MAPI consta de 15 indicadores

AUTOPSIA PSICOLOGICA

MAPI

- ◆ Totalmente estructurado y sistematizado
- ◆ Instrumento cerrado eliminado el margen de sesgo del explorador
- ◆ Verificable por 3 peritos
- ◆ Estadísticamente confiable
- ◆ Aplicable al margen del sistema de administración de justicia
- ◆ Aplicación transcultural

AUTOPSIA PSICOLOGICA

AREAS EXPLORADAS POR EL MAPI

- ◆ Datos sociodemográficos
- ◆ Antecedentes patológicos personales y familiares (toxicológicos)
- ◆ Estado mental (sensopercepción, conciencia, memoria, orientación)
- ◆ Relación consigo, con los demás y con las cosas, con el autor de su muerte

AUTOPSIA PSICOLOGICA


- ◆ Conducta, alimentación, sexualidad, sueño, actividad, lenguaje
- ◆ Psicopatología
- ◆ Conflictos (personales, familiares, económicos, antecedentes judiciales, duelos,)
- ◆ Rasgos de personalidad, intereses
- ◆ Señales de suicidio

AUTOPSIA PSICOLOGICA

METODOLOGIA QUE DEBE APLICARSE AL MAPI

Preferentemente se debe realizar luego de los 6 meses de producido el fallecimiento, por el proceso de duelo que afecta a los allegados, pero antes del año y medio, para que los datos obtenidos no estén distorsionados

AUTOPSIA PSICOLOGICA



GRACIAS

